



# BISMUCAR<sup>®</sup> Sabor a Cereza

Subsalicilato de Bismuto

262 mg

Tabletas masticables

**Lea este inserto detenidamente antes de empezar este medicamento, porque contiene información importante para usted.**

- Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este inserto o las indicadas por su médico o farmacéutico.
- Conserve este inserto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este inserto.
- Debe suspender su uso y preguntar al médico o farmacéutico o enfermero, si los síntomas empeoran o perduran por más de 2 días, presenta zumbido de oídos o pérdida de la audición, o la diarrea dura más de 2 días.

## Contenido del inserto

1. ¿Qué es **BISMUCAR Sabor a Cereza** y para qué se utiliza?
2. ¿Qué necesita saber antes de empezar a tomar **BISMUCAR Sabor a Cereza**?
3. ¿Cómo usar **BISMUCAR Sabor a Cereza**?
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de **BISMUCAR Sabor a Cereza**
6. Contenido del envase e información adicional

### 1. ¿Qué es **BISMUCAR Sabor a Cereza** y para qué se utiliza?

**BISMUCAR Sabor a Cereza**, es un medicamento que contiene **Subsalicilato de bismuto**.

Está indicado para el alivio eficaz de náuseas, malestar estomacal, indigestión, acidez, gas, eructos, sensación de llenura y controla la diarrea para adultos y niños a partir de 16 años.

Si los síntomas no desaparecen en 2 días, hable con su farmacéutico o médico.

### 2. ¿Qué necesita saber antes de empezar a tomar **BISMUCAR Sabor a Cereza** **No tome BISMUCAR Sabor a Cereza**?:

- Si es alérgico al principio activo o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento (incluido en la sección 6).
- Si presenta heces sanguinolentas o negras.
- Si presenta caso de úlceras o problemas hemorrágicos.
- Si se encuentra embarazada o dando de lactar.
- Si está tomando medicamentos que contienen aspirina u otros antiinflamatorios no esteroideos

o si tiene problemas con el riñón o gota.

- No debe ser usado por niños menores de 16 años de edad.

#### **Advertencias y precauciones:**

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar.

Existe una posible asociación entre los salicilatos y el síndrome de Reye cuando se administra a niños.

El síndrome de Reye es una enfermedad muy rara que puede ser fatal. Por esta razón, **no se deben administrar salicilatos a niños menores de 16 años**, a menos que lo indique un médico.

Contiene salicilatos, lo cual puede causar alergias. No usar si es alérgico a los salicilatos (incluida el ácido salicílico) o está tomando otros productos con salicilatos.

Los pacientes que tienen trastornos de la coagulación de la sangre, gota o que toman subsalicilato de bismuto no debe utilizarse si los síntomas son graves o persisten durante más de 2 días.

No exceder la dosis recomendada. No lo use por más de 2 días excepto por recomendación de un médico. El uso a dosis superiores a las recomendadas o durante periodos prolongados se asocia con un mayor riesgo de efectos secundarios (especialmente intoxicación por bismuto).

#### **Toma de BISMUCAR Sabor a Cereza con otros medicamentos**

La absorción de antibióticos de tetraciclina puede reducirse cuando se tomen concomitantemente con productos que contienen bismuto, aunque esta interacción puede minimizarse separando la dosis de los dos fármacos por un par de horas. Preguntar a su médico y/o farmacéutico antes de utilizar este producto, si está tomando algún medicamento para anticoagulación (por ejemplo, Warfarina), diabetes (por ejemplo, clorpropamida, glibenclamida), gota (por ejemplo, probenecid) o artritis.

#### Embarazo, lactancia y fertilidad

No lo use si se encuentra embarazada o dando de lactar. Preguntar a un profesional de salud antes de utilizar este medicamento.

#### Conducción y uso de máquinas:

No se conocen efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas

### **3. Cómo tomar BISMUCAR Sabor a Cereza**

Tome siempre este medicamento exactamente como se describe en este inserto o como le haya indicado su médico o farmacéutico. Consulte a su médico o farmacéutico si no está seguro.

La dosis recomendada es:

- **Adultos y niños mayores de 16 años:** Masticar por vía oral 2 tabletas cada ½ a 1 hora según sea necesario no exceda de 8 dosis (16 tabletas) en 24 horas.

No exceda la dosis recomendada. Usar hasta que la diarrea se detenga, pero no más de 2 días a menos que el médico lo indique. Beber abundantes líquidos transparentes para ayudar a prevenir la deshidratación causada por la diarrea. Las tabletas deben masticarse o disolverse en la boca.

Si los síntomas son graves, hable con su farmacéutico o médico.

Si los síntomas no desaparecen en 2 días, hable con su farmacéutico o médico.

- **Niños menores de 16 años:** consulte a un médico

**Si toma demasiado:** consulte con un médico inmediatamente.

**Si toma más BISMUCAR Sabor a Cereza del que debe:** Si usted ha tomado más **BISMUCAR Sabor a Cereza** de lo que debe podrá notar: confusión, excitabilidad, inquietud, nerviosismo, irritabilidad, náuseas y vómitos.

#### 4. Posibles efectos adversos

Cuando use este producto puede presentar de manera temporal pero inofensivo oscurecimiento de las heces y/o lengua. Se debe suspender su uso y preguntar al médico y/o farmacéutico si los síntomas empeoran o perduran por más de 2 días, presenta zumbido de oídos o pérdida de la audición, la diarrea dura más de 2 días.

#### Comunicación de efectos adversos:

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este inserto. Se les pide a los profesionales de la salud y a los pacientes usuarios reportar cualquier sospecha de reacción adversa al correo electrónico [farmacovigilancia@minsa.gob.pe](mailto:farmacovigilancia@minsa.gob.pe). También puede comunicarlos directamente a través de la Central de Atención Farmacovigilancia: Teléfono 610 3100 anexo 148 o al correo electrónico: [farmacovigilancia@eurofarma.com.pe](mailto:farmacovigilancia@eurofarma.com.pe)

Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

#### 5. Conservación

Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. Almacenar a una temperatura no mayor a 30°C. No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase. La fecha de vencimiento es el último día del mes que se indica.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

#### 6. Contenido e información adicional

Almidón de maíz, Manitol, Povidona K90 (Polivinil Pirrolidona K90), Colorante Rojo FDC N° 40 C.I. 16035, Aspartamo granular, Talco, Saborizante cereza en polvo, Estearato de magnesio, Alcohol etílico y Agua purificada.

